

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

ARATRO 200 mg / 5 ml Powder for oral suspension
Azithromycin

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

What is in this leaflet:

1. What ARATRO 200 mg / 5 ml powder for oral suspension in bottle is and what it is used for
2. What you need to know before you take ARATRO 200 mg / 5 ml powder for oral suspension in bottle
3. How to take ARATRO 200 mg / 5 ml powder for oral suspension in bottle
4. Possible side effects
5. How to store ARATRO 200 mg / 5 ml powder for oral suspension in bottle
6. Contents of the pack and other information

1. WHAT ARATRO 200 MG / 5 ML POWDER FOR ORAL SUSPENSION IN BOTTLE IS AND WHAT IT IS USED FOR

ARATRO 200 mg / 5 ml is a powder for oral suspension in bottle. Each pack contains one bottle of 15 ml or 30 ml.

Azithromycin belongs to a group of antibiotics called macrolides. It is used to treat the following infections:

- Lower and upper respiratory tract infections, such as otitis media, sinusitis, pharyngotonsillitis, bronchitis and pneumonia.
- Skin and soft tissue infections.
- Sexually transmitted diseases.

2. BEFORE YOU TAKE ARATRO 200 mg / 5 ml POWDER FOR ORAL SUSPENSION IN BOTTLE

Do not take ARATRO 200 mg / 5 ml

If you are allergic (hypersensitive) to azithromycin or any of the other ingredients of ARATRO 200 mg / 5 ml.

Take special care with ARATRO 200 mg / 5 ml

- If you suffer severe liver disease. If this were the case, warn your doctor.
- If you develop severe and persistent diarrhoea during or after the treatment, inform your doctor.
- It is possible that, as with other antibiotics, during the treatment with this medicine there is a fungal infection. If this were the case, inform your doctor.
- If during the treatment with ARATRO 200 mg / 5 ml any allergic reactions characterized by symptoms such as itching, redness, rash, swelling or breathing difficulties occurs, you should inform your doctor immediately.

Other medicines and ARATRO 200 mg / 5 ml

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

ARATRO 200 mg / 5 ml may interact with other medicines. Tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following medicines:

- Ergot derivatives (such as ergotamine, used to treat migraine)
- Ciclosporin (medicine used in transplanted patients)
- Digoxin (used to treat heart arrhythmias)
- Antacids, cimetidine (medicines used in digestive problems). If you are taking ARATRO 200 mg / 5 ml and antacids, avoid simultaneous administration of both medicines at the same hour of the day.
- Nelfinavir, zidovudine (medicines used in the treatment of human immunodeficiency virus infection)
- Dicumarinic anticoagulants (medicines used to prevent blood clot formation)
- Terfenadine (medicine used to treat allergic reactions and hay fever)
- Rifabutin (medicine used for the treatment of pulmonary tuberculosis and non-pulmonary infections caused by mycobacteria)

Pregnancy and breast-feeding

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

ARATRO 200 mg / 5 ml is not recommended during pregnancy and breast-feeding, unless, under medical judgement, the benefit outweighs the risk for the child.

Use in children

ARATRO 200 mg / 5 ml should not be given to children under 6 months old.

Driving and using machines

There are no evidences that ARATRO 200 mg / 5 ml have an effect on the ability to drive or operate machinery.

Important information about some of the ingredients of ARATRO 200mg / 5ml

Each 5 ml of prepared suspension of this medicine contains 3.62 g of sucrose. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicinal product.

3. HOW TO TAKE ARATRO 200 mg / 5 ml POWDER FOR ORAL SUSPENSION IN BOTTLE

Always take this medicine exactly as your doctor told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Remember to take your medicine. Your doctor will inform you of the duration of the treatment with ARATRO 200 mg / 5 ml. The dose will be determined by the doctor according to your individual needs and the type of infection. For optimal efficiency, faithfully follow your doctor's instructions regarding the dose and duration of treatment.

ARATRO 200 mg / 5 ml is administrated orally. For ease of administration, each bottle comes with a dosing syringe. The powder for suspension may exceed the signal level marked on the bottle. This fact is normal and due to the density of the preparation.

Preparation of the suspension

- Turn the bottle and shake gently until all the powder moves freely.
- Open the bottle and add the following amount of water depending on the size of the bottle, using the syringe that accompanies: 15 ml bottle: add 10 ml of water. 30 ml bottle: add 15 ml of water.
- Place the perforated plastic cap and press it until it is introduced into the mouth of the bottle.
- Close the bottle with the metal cap.
- Shake vigorously until a homogeneous suspension.
- Do not forget to shake the suspension before each intake.

Administration of the preparation

- Open up the metal cap. Insert the syringe in the perforated plastic cap.
- Turn the bottle upside down so it remains in a vertical position while holding the syringe in place.
- Fill the syringe to the extent corresponding to the dose prescribed by your doctor.
- Invert the bottle again, remove the syringe and proceed to the administration.
- Wash the syringe after each administration.

As a general rule, the dose of medicine and the frequency of administration are as follows:

Adults (including elderly patients):

To adjust more easily the dose, it is convenient to use other presentations. The recommended dose is 500 mg/day, in one take, for 3 consecutive days; therefore, the total dose is 1500 mg. As an alternative, the same total dose can be distributed over 5 days as one single dose of 500 mg the first day, and then 250 mg once daily from day 2 to day 5. For the treatment of sexually transmitted diseases, the dose is 1000 mg taken as a single oral dose.

Children and adolescents:

In general, with the only exception of the treatment of streptococcal pharyngotonsillitis, the recommended dose is 10 mg/kg/day, administered in a single dose for 3 consecutive days. As an alternative, the same total dose can be distributed over 5 days, administering 10 mg/kg on day one, to continue with 5 mg/kg/day for the 4 remaining days. The dosage regimen is based on the weight as follows:

Less than 15 kg: 10 mg/kg/day (given in one dose) during 3 consecutive days; as an alternative, 10 mg/kg on day one, to continue with 5 mg/kg/day for the remaining 4 days, administered in a daily single dose.

15-25 kg: 200 mg/day (given in one dose) during 3 consecutive days; as an alternative, 200 mg on day one, to continue with 100 mg/day for the remaining 4 days, administered in a single daily dose.

26-35 kg: 300 mg/day (given in one dose) during 3 consecutive days; as an alternative, 300 mg on day one, to continue with 150 mg/day for the remaining 4 days, administered in a single daily dose.

36-45 kg: 400 mg/day (given in one dose) during 3 consecutive days; as an alternative, 400 mg on day one, to continue with 200 mg/day for the remaining 4 days, administered in a single daily dose.

More than 45 kg: ... The same adult dose (500 mg/day, in one take, for 3 days).

For the treatment of streptococcal pharyngotonsillitis should be given a dose of 20 mg/kg/day for 3 consecutive days, without exceeding the maximum daily dose of 500 mg. If you consider that the action of ARATRO 200 mg / 5 ml is too strong or too weak, talk to your doctor or pharmacist.

If you take more ARATRO 200 mg / 5 ml than you should

Contact your doctor or pharmacist immediately.

If you forget to take ARATRO 200 mg / 5 ml

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking ARATRO 200 mg / 5 ml

There is a risk of relapse of the disease.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, ARATRO 200 mg / 5 ml can cause side effects although not everybody gets suffer them.

Most adverse effects observed in clinical trials were of mild to moderate nature, reversible after discontinuation of the medicine and they mainly affected the digestive system and consisted mainly of nausea, vomiting, diarrhoea or abdominal pain.

Potentially serious adverse reactions such as laryngeal edema (due to allergic reaction) or impaired liver function are accompanied by yellowing of the skin rarely occurred. Also, during treatment with ARATRO 200 mg / 5 ml any of the following side effects, described for Azithromycin when administered orally, could appear.

- Thrombocytopenia (low platelet count) and transient episodes of mild neutropenia (low white blood cell count).
- Aggressive reactions, nervousness, agitation, anxiety, dizziness/vertigo, convulsions, headache, drowsiness and hyperactivity.
- Hearing impairment and exceptionally, altered taste.
- Cardiac disorders.
- Digestive disorders such as anorexia, nausea, vomiting/diarrhoea (reaching an exceptional cause dehydration), loose stools, abdominal discomfort (stomach pain/cramps), constipation, gas, and rarely severe diarrhoea, discolouration of the tongue.
- Impaired function of liver (rarely severe) and kidney.
- Skin reactions such as itching, rash, sensitization to light, fluid accumulation or urticaria (rash). Exceptionally severe skin reactions have taken place.
- Joint pain.
- Vaginal fungal infection (vaginitis).
- Fungal infections, fatigue, tingling sensation and allergic reactions.

If you consider that any of the side effects you suffer are serious or if you suffer any adverse effect that has not been mentioned in this leaflet, please inform your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE ARATRO 200 mg / 5 ml

Store below 30 °C.

The validity period of the reconstituted suspension is 10 days.

Keep this medicine out of the reach and sight of children.

Do not take ARATRO 200 mg / 5 ml after the expiry date which is stated on the label after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.

Do not take ARATRO 200 mg / 5 ml if you notice visible signs of deterioration. Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

What ARATRO 200 mg / 5 ml contains

The active substance is azithromycin (dihydrate). Each 5 ml of reconstituted suspension contains 200 mg of azithromycin.

The other ingredients are sucrose, hydroxypropylcellulose, trisodium phosphate anhydrous, xanthan gum, cherry, banana and vanilla flavours.

What ARATRO 200 mg / 5 ml looks like and contents of the pack

ARATRO 200 mg / 5 ml is a powder for oral suspension in bottle. Each pack contains one bottle of 15 ml or 30 ml.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

ARAFARMA GROUP, S.A.
C/ Fray Gabriel de San Antonio, 6-10
Pol. Ind. del Henares
19180 Marchamalo (Guadalajara), Spain.

نشرة العبوة : معلومات للمستخدم

مسحوق (بودرة) ARATRO 200 mg / 5 ml أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر المعلق للتناول عن طريق الفم .

أزيثروميسين

- يرجى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.
- احفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى
- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات او المشورة ، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.
- تم وصف هذا الدواء لك ، لا توصفه للآخرين. فهو قد يضرهم ، حتى لو كان لديهم نفس أعراض مرضك.
- في حالة حدوث أي من الآثار الجانبية ، فيرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

الأطفال والمراهقون

بشكل عام ، مع الاستثناء الوحيد لعلاج التهاب البلعوم والبلعوم الثلاثي ، فإن الجرعة الموصى بها هي 10 ملليغرام / كجم في اليوم ، تؤخذ في جرعة واحدة لمدة 3 أيام متتالية. أو بطريقة أخرى ، يمكن توزيع نفس الجرعة الإجمالية على مدى 5 أيام ، بإعطاء 10 ملليغرام / كجم في اليوم الأول ، لتستمر مع 5 ملليغرام / كجم في اليوم للأيام الأربعة المتبقية. يعتمد نظام الجرعات على الوزن كما يلي:

أقل من 15 كجم 10 ملليغرام / كجم في اليوم (تغطي جرعة واحدة) خلال 3 أيام متتالية: أو بطريقة أخرى ، 10 ملليغرام / كجم / يوم ، في اليوم الأول ، يستمر بجرعة 5 ملليغرام / كجم في اليوم لمدة 4 أيام متبقية ، تغطي جرعة واحدة يومية.

15-25 كجم 200 ملليغرام في اليوم (تغطي جرعة واحدة) خلال 3-4 أيام متتالية: بطريقة أخرى ، 200 ملليغرام / كجم في اليوم ، في اليوم الأول ، للاستمرار بجرعة 100-200ملليغرام / كجم / في اليوم للأيام الأربعة المتبقية ، تتناوله بجرعة واحدة يومية.

26-35 كجم 300 ملليغرام / يوم (تغطي بجرعة واحدة) خلال 3 أيام متتالية: أو بطريقة أخرى ، 300 ملليغرام / كجم في اليوم في اليوم الأول ، للاستمرار بـ 150 ملليغرام / كجم / في اليوم للأيام الأربعة المتبقية ، تتناوله بجرعة واحدة يومية.

36-45 كجم 400 ملليغرام / في اليوم (تغطي بجرعة واحدة) خلال 3 أيام متتالية: بطريقة أخرى ، 400 ملليغرام / كجم / يوم في اليوم الأول ، للاستمرار بجرعة 200 ملليغرام / كجم / في اليوم للأيام الأربعة المتبقية ، تتناوله بجرعة واحدة يومية.

أكثر من 45 كجم نفس جرعة البالغين (500 ملليغرام / يوم في جرعة واحدة لمدة 3 أيام

لعلاج التهاب البلعوم العقدي يجب أن تعطى جرعة 20 ملليغرام / كجم / في اليوم لمدة 3 أيام متتالية دون تجاوز الجرعة اليومية القصوى البالغة 500 ملليغرام. إذا كنت تعتقد أن تأثير أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر قوي جدًا أو ضعيف جدًا ، استشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك .

إذا تناولت كمية من شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر أكثر مما يجب.

قم بإبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك على الفور

إذا أغفلت عن تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية

إذا توقفت عن تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر إذا توقفت عن تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر ، هناك خطورة على المريض من أن تسوّ الأعراض التي يعاني منها. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي الخاص بك .

4- الآثار الجانبية المحتملة

مع جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر آثارًا جانبية على الرغم من عدم تعرض الجميع لها. كانت معظم التأثيرات التي لوحظت في التجارب السريرية ذات طبيعة خفيفة إلى معتدلة ، ويمكن أن تكون عكسية بعد التوقف عن تناول الدواء وتآثرت بشكل رئيسي في الجهاز الهضمي وتتألف بشكل رئيسي من الغثيان والقيء والإسهال وآلام في البطن. نادرا ما تحدث ردود فعل سلبية خطيرة مثل وذمة الحنجرة (سبب الحساسية) أو ضعف وظائف الكبد مصحوبة باصفرار الجلد. بالإضافة إلى ذلك ، أثناء العلاج بـشراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر، يمكن أن تظهر أي من الآثار الجانبية التالية ، الموصوفة أزيثروميسين عند تناوله عن طريق الفم.

- قلة الصفيحات (انخفاض عدد الصفائح الدموية) ونوبات عابرة من قلة العدلات الخفيفة (انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء)
- ردود فعل عدوانية ، عصبية ، هياج ، قلق. دوخة / دوار ، تشنجات ، صداع ، نعاس وفرط نشاط
- ضعف السمع والذوق المتغير بشكل استثنائي
- اضطرابات القلب
- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية ، والغثيان ، والقيء / الإسهال (الوصول إلى سبب استثنائي للجفاف) ، و البراز الرخو ، وعدم الراحة في البطن (تقلصات المعدة) ، والإمساك ، والغازات ، وتآثر الإسهال الشديد ، وإفراز اللسان.
- قصور في وظائف الكبد (نادراً ما يكون شديداً) والكلبي
- ردود فعل جلدية مثل الحكة ، الطفح الجلدي ، التحسس للضوء ، تراكم السوائل أو الشرى (طفح جلدي). حدثت تفاعلات جلدية شديدة بشكل استثنائي.
- ألم المفصل.
- العدوى الفطرية المهبلية (التهاب المهبل).
- التهابات الفطرية ، التعب ، الإحساس بالوخز وردود الفعل التحسسية.

إذا كنت تعتقد أن أيًا من الأعراض الجانبية التي تعاني منها خطيرة أو إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة ، فيرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

5- كيفية تخزين أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 30 درجة مئوية.

إستخدام شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في خلال عشرة أيام من تاريخ تحضيره .

يحفظ هذا الدواء بعيداً عن متناول ورؤية الأطفال.

لا تستخدم أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق والعبوة بعد إنتهاء الصلاحية . يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا تتناول أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر إذا لاحظت علامات تدهور واضحة.

لا يجب التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. استفسر من الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. ستساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

6- محتويات العبوة ومعلومات إضافية

ما هي محتويات شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر؟

العادة الفعالة هي أزيثروميسين (ثنائي هيدرات). تحتوي كل 5 مليلتر من الشراب المعاد تكوينه على 200 ملليغرام أزيثروميسين. المكونات الأخرى هي السكروز ، هيدروكسي بروبيل سلولوز ، فوسفات ثلاثي الصوديوم الالماني ، صمغ الزنثان ، الكرز ، نكهات الموز والفانيليا.

ما هو شكل شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر وما هي محتويات العبوة؟

شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر هو مسحوق بودرة يؤخذ عن طريق الفم معياً في زجاجة . تحتوي كل عبوة على زجاجة واحدة بسعة 15 مليلتر أو 30 مليلتر.

مالك حق ترخيص التسويق والشركة المصنعة

ملليغراموعة آرا فارما ، شركة محدودة

ج / فرار غابرييل دي سان أنطونيو ، 6/10

بول. إنديانا دي هيناريس

19180 مارشامالو (غوادالاخارا) ، إسبانيا|

محتويات هذه النشرة:

1. ما هو شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في زجاجة وما هي دواعي استعماله.
2. ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر المعلق الذي يؤخذ عن طريق الفم والمعياً في زجاجة .
3. كيف يتم تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في زجاجة.
4. الآثار الجانبية المحتملة.
5. كيفية تخزين شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في زجاجة .
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى .

1- ما هو شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر المعبأ في زجاجة وما هي دواعي استعماله؟

أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر هو مسحوق من البودرة معياً في زجاجة يؤخذ عن طريق الفم . تحتوي كل عبوة على زجاجة واحدة بسعة 15 مليلتر أو 30 مليلتر.

ينتمي أزيثروميسين إلى **ملليغراموعة من المضادات الحيوية التي تسمى الماكروليدات**. يتم استخدامه **لعلاج الالتهابات التالية:**

- التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي مثل التهاب الأذن الوسطى والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب البلعوم واللوزتين والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.
- التهابات الجلد والأنسجة الرخوة.
- الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس.

2- قبل تناول جرعة شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر المعبأ في زجاجة

لا تستخدم أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر

- إذا كان لديك حساسية (شديدة الحساسية) أزيثروميسين أو أي من مكونات أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر الأخرى.

توخ الحذر عند تناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من قصور كبدي حاد . في هذه هي الحالة ، قم بإبلاغ طبيبك.
- إذا أصبت بإسهال حاد ومستمر أثناء العلاج أو بعده ، أخبر طبيبك الخاص.
- من الممكن أن يكون هناك عدوى فطرية ، كما هو الحال مع المضادات الحيوية الأخرى أثناء العلاج بهذا الدواء. إذا كنت هذه هي الحالة ، أبلغ طبيبك.
- إذا حدث أثناء العلاج بأراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر أي تفاعلات تحسسية مصحوبة بأعراض مثل الحكة والاحمرار والطفح الجلدي أو توروم أو صعوبات في التنفس ، يجب إبلاغ طبيبك على الفور.

تناول أدوية أخرى

يرجى إخبار طبيبك الخاص أو الصيدلي إذا كنت تتناول / تستخدم أو تناولت / استخدمت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

قد يتفاعل أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر مع أدوية أخرى. يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول آيًا من الأدوية التالية:

- مشتقات الإرقوت (مثل الإرقوتامين ، وتستخدم لعلاج الصداع النصفي)
- سيكلوسبورين (دواء يؤخذ في علاج مرضى زراعة الأعضاء)
- الديجوكسين (يؤخذ في علاج عدم انتظام ضربات القلب).
- مضادات الحموضة ، سييميتيدين (الأدوية المستخدمة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي).
- إذا كنت تأخذ أراترو ٢٠٠ ملليغرام ٥ مليلتر وأدوية مضادات الحموضة ، تجنب تناول المتزامن لكلا الدوائين في نفس الساعة من اليوم.
- نلفينايفير ، زيدوفودين (الأدوية المستخدمة في علاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية)
- مضادات التخثر الديكومايرين (الأدوية المستخدمة في علاج منع تكوين الجلطة الدموية)
- تيرفينادين (دواء يؤخذ في علاج الحساسية وحصى الفشل)
- ريفامبين (دواء يؤخذ في علاج السل الرئوي والالتهاب غير الرئوي التي تسببها المتفطرات)

الحمل والرضاعة

يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، تعتقدن أنك حامل أو تخططين لإنتاج طفل ، استشري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

لا يوصى باستخدام أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر أثناء الحمل والرضاعة ، إلا إذا كان القرار الطبي يفوق المخاطر التي يتعرض لها الطفل.

الاستخدام في الأطفال

لا ينبغي إعطاء أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر للأطفال دون سن 6 أشهر.

القيادة واستعمال الآلات

لا توجد أدلة على أن عثار أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر له تأثير على القدرة على القيادة أو تشغيل الآلات.

معلومات مهمة عن بعض مكونات أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر

تحتوي كل 5 مليلتر من الشراب المحضر من هذا الدواء على 3.62 غرام من السكروز. إذا كان قد تم إبلاغك من قبل طبيبك أنه لديك حساسية تجاه بعض السكريات ، فيجب استشارة طبيبك قبل تناول هذا المنتج الطبي.

3- كيف تتناول شراب أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر في زجاجة .

احرص دائماً على تناول هذا الدواء تماماً كما أبلغك طبيبك. استشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا.

احرص على تناول دوائك بانتظام . سيبلغك طبيبك بمدة علاج أراترو 200 ملليغرام / 5 مليلتر. سيتم تحديد الجرعة من قبل الطبيب وفقاً لاحتياجاتك الفردية ونوع الإصابة. لتحقيق النتائج الفضلى، اتبع تعليمات طبيبك بأمانة فيما يتعلق بالجرعة ومدة العلاج.

يأخذ أراترو 200 ملليغرام 5 مليلتر عن طريق الفم . من أجل تسهيل تناوله ، يوجد مع زجاجة الدواء حقنة للجرعات. قد يتجاوز الشراب مستوى الإشارة المحدد على الزجاجة . حيث أنه من الطبيعي حدوث ذلك بسبب كثافة الشراب.

تحضير المستحضر

- أقلب الزجاجة ورجها برفق حتى يتحرك المحلول بحرية.

• افتح الزجاجة وأضف الكمية التالية من الماء حسب حجم الزجاجة ، باستخدام الحقنة المرفقة: زجاجة 15 مليلتر: أضف 10 مليلتر من الماء زجاجة30 مليلتر: أضف 15 مليلتر من الماء.

- ضع الغطاء البلاستيكي المثقوب واضغط عليه حتى يتم إدخالها في قم الزجاجة .

• أغلق الزجاجة بإغلاق المعدني.

- تُرج الزجاجة بقوة حتى يصبح الشراب متجانساً

- لا تنس رج الشراب قبل كل إستخدام .

طريقة التحضير

- افتح الغطاء المعدني. أدخل الحقنة في الغطاء البلاستيكي المثقوب.
- أقلب الزجاجة رأساً على عقب ، بحيث تظل في وضع عمودي مع تثبيت الحقنة في مكانها.
- إملاً الحقنة بالقدر المناسب بالجرعة التي وصفها طبيبك.
- أقلب الزجاجة مرة أخرى ، أخرج الحقنة وانتقل إلى تناول الدواء .
- اغسل الحقنة بعد كل تناول الدواء.

كقاعدة عامة ، يجب أن تكون جرعة الدواء وإعادة إستخدامه كالتالي :

إلخبار (بما في ذلك المرضى المستنن)

من أجل ضبط الجرعة بسهولة أكبر ، من الأفضل استخدام الجرعات بالطريقة الموصى بها وهي 500 ملليغرام في اليوم في جرعة واحدة ، لمدة 3 أيام متتالية ، وبالتالي ، فإن ملليغرامووع الجرعات هي 1500 ملليغرام. وبطريقة أخرى ، يمكن توزيع نفس الجرعة الإجمالية على مدى 5 أيام في جرعة واحدة من 500 ملليغرام في اليوم الأول ، و ثم 250 ملليغرام مرة واحدة يومًا من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس. ومن أجل علاج الأمراض الجنسية ، تكون الجرعة 1000 ملليغرام تؤخذ جرعة قموية واحدة.